

XXIV

Tribus BOMBYLIDORUM (J. Bigot et auctorum).

Genres **Lygira** (Newmann) et **Comptosia** (Macq.).

Notre savant Maître en Diptérologie, Macquart, peu de temps après la publication de son genre *Comptosia*, destiné à circonscrire ceux des *Anthraciens*, chez lesquels, la troisième, et, le plus souvent aussi, la quatrième nervure longitudinale de l'aile, s'infléchissent à leur extrémité, de telle sorte, que ladite troisième nervure revient sur elle-même, avant de s'anastomoser avec la deuxième, Macquart a rendu plus tard ce même genre peu homogène. Cela se comprendra sans peine, car l'unique caractère propre à reconnaître ce dit genre, n'offre, dans sa diagnose, rien de rigoureux, rien de réellement important, si bien, qu'il fut encore ultérieurement démembré par divers autres auteurs : Newmann (Entomologist, 1841-42) créa, à ses dépens, le genre *Neuria*, adopté par Schiner (Novarra Exedit.), qui fonda le genre *Tritoneura* (loc. cit.), son très proche voisin. Or, ce dernier me semble différer si peu du genre *Alyosia* (Rondani, Dipt. Exot., 1863), qu'il me paraîtrait rationnel d'effacer son nom, en vertu de la loi d'antériorité, pour conserver l'appellation de Rondani ?

Rondani (loc. cit.) a subdivisé le genre *Comptosia* en quatre nouvelles coupes suffisamment distinctes, *G. Lyophlæba*, *Comptosia*, *Macrocondyla* et *Alyosia*. Notons ici, que le genre *Tritoneura* (Schiner) s'écarte un peu des genres *Comptosia* par la conformation de ses antennes.

Schiner, tout en adoptant les anciens genres *Neuria* et *Comptosia*, semble ne plus tenir compte du genre *Lygira*. Je ne puis partager cette manière de voir dont les raisons m'échappent !

Les caractères primitivement assignés par Macquart (Dipt. Exot.), à son genre *Comptosia*, me semblent tellement vagues, qu'il ne saurait être, à mon avis, utilement conservé ? En effet, le nombre des cellules sous-marginales de l'aile varie de trois à quatre, comme chez d'autres *Anthraciens*; la longueur de la trompe n'a rien de fixe, puisque les *C. Landbecki* et *montana* (Philippi) en possèdent une, presque aussi développée que celle des *Mutio*, *Exoprosopa* ou Genres voisins. Je me sens conséquemment fort enclin à récuser complètement l'ancien genre

Comptosia, de même que toutes les subdivisions pratiquées dans son sein. J'en dirai tout autant du genre *Neuria*. A mon point de vue, il serait beaucoup plus simple de fondre toutes ces coupes, mal délimitées, dans les vieux genres *Anthrax*, *Exoprosopa* et quelques autres en petit nombre. Une révision générale du groupe des *Anthraciens* devient de plus en plus urgente, mais, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, mieux vaudrait simplifier les classifications, en faisant table rase de toutes ces vagues circoncriptions qui encombrant la nomenclature.

Quoi qu'il advienne, je rapporte présentement au genre *Lygira* (Newm.) l'espèce nouvelle dont suit la description :

L. RUBRIFERA (mihi). — Long. 16 mill.

♀. *Fusco nigro. Antennis testaceis, apice luteis; fronte nigrâ, subtus fulvo villosâ; facie albido flavo villosâ; haustello fulvo, apice nigro; thorace fulvo, pleuris cinereo, scutello rufo pilosis; abdomine nigro, parum flavido villoso, vix fulvo cinereo villoso; halteribus fulvis; pedibus fulvis, tarsis, apice, fuscis, pulvillis albidis; alis pallidè castaneis, venis rufis.*

♀. Antennes, premier article médiocrement renflé, deuxième court, troisième allongé; trompe relevée, atteignant à peine la base des antennes, et couchée dans l'ouverture buccale; ailes, deux cellules sous-marginales, anale entr'ouverte.

D'un noir brunâtre. Antennes testacées, dernier article (*chète*), noirâtre, la villosité antennale noire en dessus, roussâtre en dessous; trompe fauve à bout noir; front noir, assez élargi, quelques poils fauves au-dessus des antennes, villosité faciale d'un blanc jaunâtre; thorax à duvet d'un fauve jaunâtre, principalement en avant, flancs et poitrine à duvet gris, angles postérieurs, écusson, lisses, d'un fauve rougeâtre; balanciers fauves; abdomen noir, avec duvet grisâtre antérieurement, brun en arrière, segments très finement bordés de rougeâtre, ventre un peu rougeâtre avec un fin duvet gris; pieds d'un fauve rougeâtre, tarses bruns à l'extrémité, pelotes blanchâtres; ailes d'un brun pâle avec les nervures rougeâtres.

Australia. — Ma collection.

